


একাদশ শ্রেণী একাডেমিক প্রোগ্রাম ২০২০


রসায়ন ১ম পত্র

লেকচার : C-05

অধ্যায় 2 : গুণগত রসায়ন



দ্রব্যতা ও দ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা



দ্রাব্যতা ও দ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা

□ দ্রাব্যতা: → দ্রবের সীমিত [সম্পৃক্ত] দ্রবণ = দ্রাব্যতা

সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ঘনমাত্রাকে ঐ দ্রবের দ্রাব্যতা বলে। অথবা, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব 100g দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে সেই ভর প্রকাশক সংখ্যাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রাব্যতা বলে।

$T = 25^{\circ}\text{C}$

$\therefore \text{NaCl ২\% দ্রাব্যতা} = 40 \square$

$\text{দ্রব} = 40\text{g}$

$\text{দ্রবক} = 100\text{g}$

$\text{দ্রবন} = (100 + 40) = 140\text{g}$

no unit

$T = 25^{\circ}\text{C}$

$\text{KCl ২\% দ্রাব্যতা} = 25$

$\text{দ্রব} = 25\text{g}$

$\text{দ্রাবক} = 100\text{g}$

$\therefore \text{দ্রবন} = 125\text{g}$

Poll Question -1

□ কোন যৌগের দ্রাব্যতা ৬০ হলে তার দ্রব ও দ্রবণের পরিমাণ কত ?

- ✓ (a) দ্রব ৬০ গ্রাম ও দ্রবন ১৬০ গ্রাম
(b) দ্রব ৫০ গ্রাম ও দ্রবন ১৫০ গ্রাম
(c) দ্রব ৬০ গ্রাম ও দ্রবন ১৫০ গ্রাম
(d) দ্রব ৫০ গ্রাম ও দ্রবন ১৬০ গ্রাম


$$\text{দ্রাব্যতা} = 60$$

$$\therefore \text{দ্রব} = 60 \text{ g}$$

$$\text{দ্রবক} = 100 \text{ g}$$

$$\therefore \text{দ্রবন} = 160 \text{ g}$$

দ্রাব্যতার নির্ভরশীলতা



iii. তাপমাত্রা → next slide

iv. চাপ → CO_2 গ্যাস

মুখ সীমা
২০ কল
পানি

মুখ সীমা → CO_2 গ্যাস

মুখ সীমা → CO_2 গ্যাস

চাপ → CO_2 গ্যাস
মুখ সীমা → CO_2 গ্যাস






উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

দ্রাব্যতার নির্ভরশীলতা

T_1 = দ্রব ঘোলায় দ্রব অপমাত্রা
 T_2 = দ্রব ঘোলায় দ্রব অপমাত্রা

অপমাত্রা



✓ তাপহারী ΔT
 $T \uparrow$ বিদ্যুৎ মাঝে
 মাঝে, বেশি দ্রবীভূত হবে
 ∴ দ্রাব্যতা $\uparrow$

✓ তাপ উৎপাদী ΔT
 $T \uparrow$, বিদ্যুৎ মাঝে
 (হতে, কম দ্রবীভূত হবে,
 দ্রাব্যতা $\downarrow$

✓ neutral ΔT
 $T \uparrow, T \downarrow$ no effect =



ତାପଶାନ୍ତି
ସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ରା

ତାପଶାନ୍ତି

$T \uparrow$ ହାରତା $\uparrow$

32.4°C

Na_2SO_4 ତରଳ
ଅବସ୍ଥା

32.4°C ଠାରୁ

ଘଟେଇବା $\rightarrow$ $T \uparrow$ ହାରତା $\downarrow$



গাণিতিক সমস্যাবলি

- 40°C তাপমাত্রায় কোন দ্রব্যের দ্রাব্যতা 80 হলে ঐ তাপমাত্রায় 1kg সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত গ্রাম দ্রব এবং দ্রাবক লাগবে? [RUET' 17-18]

$$\text{দ্রাব্যতা} = 80$$

$$100\text{g}$$

$$\text{দ্রব} = 80\text{g}$$

$$\text{দ্রাবক} = 100\text{g}$$

$$\therefore \text{দ্রব} = 80\text{g}$$

$$\begin{aligned} \therefore 100\text{g দ্রবনে দ্রব} &\rightarrow 80\text{g} \\ \therefore \text{দ্রাবক} &= (\text{দ্রবন} - \text{দ্রব}) \\ &= 100 - 80 \\ &= 20\text{g} \end{aligned}$$

১০০০g

$$\frac{80 \times 1000}{100} = 800\text{g}$$

৪৫৫.৫৫g

৪৫৫.৫৫g

গাণিতিক সমস্যাবলি

Poll question -2

১৩

40°C তাপমাত্রায় কোন দ্রবের দ্রাব্যতা 50 হলে ঐ তাপমাত্রায় 300g সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত গ্রাম দ্রব লাগবে?

- (a) 100g
- (b) 200g
- (c) 300g
- (d) 400g

$$\text{দ্রব} = 50\text{g}$$

$$\text{দ্রাব্যতা} = 150\text{g}$$

$$\therefore \text{দ্রব} = 150\text{g}$$

$$\therefore \frac{150\text{g}}{300\text{g}} \text{ দ্রব} = 50\text{g}$$

$$\frac{50 \times 300}{150} = 100\text{g}$$

গাণিতিক সমস্যাবলি

□ 30°C ও 55°C তাপমাত্রায় কোন একটি দ্রবের দ্রাব্যতা যথাক্রমে 50 ও 90। 30°C তাপমাত্রায় 50g দ্রবণকে 55°C তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হল। এ অবস্থায় দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে আর কত গ্রাম অতিরিক্ত দ্রবের প্রয়োজন হবে?

দ্রব = 50
 30°C
 (দ্রব ২০g, দ্রাবক 30g)
 দ্রাব্যতা = 50
 দ্রব = 50g, দ্রাবক = 100g
 দ্রব = 150g
 ∴ দ্রব = 150g হলে দ্রব = 50g
 দ্রাবক = 50g
 $\frac{50 \times 50}{150} = 16.67g$
 দ্রাবক = (দ্রব - দ্রাবক) = (50 - 16.67) = 33.33g

55°C
 দ্রাব্যতা = 90
 দ্রব = 90g, দ্রাবক = 100g
 দ্রাবক = 100g হলে দ্রব = 90g
 1g
 $90 \times 33.33 = 29.997$
 $\frac{29.997}{100} = 0.29997$
 ∴ অতিরিক্ত দ্রব = (29.997 - 16.67) = 13.327g

গাণিতিক সমস্যাবলি

* 20°C 30% 40°C তাপমাত্রায় একই দ্রব দ্রবতা 30 20% 50।

20°C তাপমাত্রায় 60g দ্রব দ্রবতা 40°C তে দ্রবতা কত হবে
কতই হবে প্রমাণ?

20°C, দ্রবতা = 30, দ্রব = 30g, দ্রব = 100g
দ্রব = 130g

130g দ্রব দ্রব = 30g

60g $\rightarrow \frac{30 \times 60}{130} = 13.85g$

$\therefore$ দ্রব = $(60 - 13.85)$
= 46.15g

40°C, দ্রবতা = 50, দ্রব = 50g, দ্রব = 100g

100g দ্রব দ্রব = 50g

46.15g $\rightarrow \frac{50 \times 46.15}{100}$

= 23.075g

$\therefore$ বাকি দ্রব = $(23.075 - 13.85)$
= 9.225g



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

রসায়ন ১ম পত্র

অধ্যায় ২। গুণগত রসায়ন

গাণিতিক সমস্যাবলি

□ 85°C তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের KCl কে 250g পানিতে দ্রবীভূত করে সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হলে। এ দ্রবণকে শীতল করে 20°C তাপমাত্রায় নিয়ে এলে কী পরিমাণ KCl অধঃক্ষিপ্ত হবে? [RUET' 17-18]

20°C , - দ্রাঘতা = 20, দ্রা = 20, দ্রাঙ্ক = 100

85°C , দ্রাঘতা = 80
দ্রা = 80, দ্রাঙ্ক = 100

100g দ্রাঙ্ক দ্রা = 20g

250g $\frac{20 \times 250}{100}$

Always same দ্রাঙ্ক 20g
∴ ওস. (ক্ষ) = (200 - 50) = 150g

100g দ্রাঙ্ক দ্রা = 80g

1g $\frac{80 \times 250}{100}$

250g $\frac{80 \times 250}{100}$
দ্রাঙ্ক দ্রাঙ্ক 20g
তাই ওস. ক্লোরাইড = 200g

গাণিতিক সমস্যাবলি

* 20°C 20% 50°C তাপমাত্রায় KCl এর দ্রাব্যতা 30, 60, 50°C তাপমাত্রায়

(i) 200g 50°C-তে দ্রবণ আছে।

(ii) 200g জল দ্রবীভূত করে 100g দ্রবণ আছে।

উক্ত দ্রবণকে ঠান্ডা করে 20°C এ রাখলে কতটুকু দ্রব অবশিষ্ট থাকবে?

(i) 20°C, দ্রাব্যতা = 30
 $\frac{30}{100} = \frac{x}{200}$

∴ 100g দ্রবকে দ্র = 30g

200g দ্রবকে $\frac{30 \times 200}{100} = 60g$

∴ অবশিষ্ট দ্রব = (200 - 60) = 140g

50°C, দ্রাব্যতা = 60
 $\frac{60}{100} = \frac{x}{200}$

100g দ্রবকে দ্র = 60g

200g দ্রবকে

$\frac{60 \times 200}{100} = 120g$

① 20°C, $\Delta T = 30$
 $\Delta T = 30$
 $\Delta T = 10$

100g $\Delta T = 30^\circ$
 $\frac{100}{100} = 1$

125g $\frac{30 \times 125}{100} = 37.5g$

always ΔT fixed

$\therefore \Delta T = (75 - 37.5) = 37.5g$

50°C, $\Delta T = 60$
 $\Delta T = 60$
 $\Delta T = 10$
 $\Delta T = 160g$
 $\Delta T = 10$
 $\Delta T = 10$
 $\Delta T = 10$

$\therefore 160g \Delta T = 60^\circ$

$\frac{160}{100} = 1.6$
 $\frac{60 \times 200}{100} = 120g$

$\therefore \Delta T = (200 - 75) = 125g$

গাণিতিক সমস্যাগুলি

- 35°C তাপমাত্রায় 20 g NaCl এর সম্পূর্ণ দ্রবণকে নেয়া হলো। এ দ্রবণকে বাষ্পীভূত করে 5.295g শুষ্ক NaCl এর অবশেষে পাওয়া গেল। 35°C তাপমাত্রায় NaCl এর দ্রাব্যতা নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{দ্রবন} &= 20\text{g} \\ \text{দ্রব} &= 5.295\text{g} \end{aligned} \quad \therefore \text{দ্রাবক} = (20 - 5.295)\text{g} = 14.705\text{g}$$

$$\therefore 14.705\text{g দ্রাবকে দ্রব} = 5.295\text{g}$$

$$\therefore \text{দ্রাবক} = 36$$

দ্রাব্যতা
100g দ্রাবক
কিমান দ্রব

$$\frac{5.295}{14.705} \times 100$$

$$\frac{5.295 \times 100}{14.705} = 36.008\text{g}$$

Ans



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

রসায়ন ১ম পত্র

অধ্যায় ২। গুণগত রসায়ন


দ্রাব্যতা গুণফল ও আয়নিক গুণফল

□ দ্রাব্যতা গুণফল ও আয়নিক গুণফল:

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় স্বল্প দ্রবণীয় লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণের এক মোল দ্রব হতে যে সকল আয়ন পাওয়া যায়, তাদের ঘাত সমন্বিত প্রত্যেকের ঘনমাত্রায় গুণফল সর্বদা ধ্রুবক। এ ধ্রুবককে ঐ তাপমাত্রায় লবণটির দ্রাব্যতা গুণফল বলে। অর্থাৎ দ্রাব্যতা গুণফল হলো লবণের সর্বোচ্চ আয়নিক গুণফল।

** যে কোনো লবণের দ্রবণে উৎপন্ন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের উপযুক্ত ঘাতসহ ঘনমাত্রার গুণফলকে সে লবণের আয়নিক গুণফল (ionic product) বলা হয়। আয়নিক গুণফল ধ্রুবক নয়, কিন্তু নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা গুণফলের মান ধ্রুবক। আয়নিক গুণফল ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে পার্থক্য হলো লবণের যেকোনো দ্রবণে আয়নদ্বয়ের ঘনমাত্রার গুণফলই আয়নিক গুণফল আর দ্রাব্যতা গুণফল হচ্ছে লবণটির সম্পৃক্ত দ্রবণে আয়নদ্বয়ের ঘনমাত্রার গুণফল।


দ্রাব্যতা গুণফল ও আয়নিক গুণফল




আয়নিক গুণফল
← K_{sp}

$$= \frac{[Al^{3+}][Al^{3+}][O^{2-}][O^{2-}][O^{2-}]}{[Al^{3+}]^2 [O^{2-}]^3}$$

[] → মোলার ঘনত্ব





$$\therefore [\text{H}^+] = 2S$$


$$[\text{SO}_4^{2-}] = S$$


საწყისი კონცენტრაცია $\rightarrow$ $S = \text{საწყისი კონცენტრაცია}$

საწყისი კონცენტრაცია $\rightarrow$ K_{ip}

$$K_{ip} = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{SO}_4^{2-}]}{(2S)^2 (S)} = 4S^3$$

K_{sp} $\rightarrow$ საწყისი კონცენტრაცია





$K_{ip} =$

$$[\text{Al}^{3+}]^2 [\text{O}^{2-}]^3$$

= $\text{amrit 2 (Al)}^\circ \text{ 3 (O)}^\circ$
 2 3 3

$K_{sp} =$

$$(2s)^2 (3s)^3$$


$\therefore [\text{Al}^{3+}] = 2s$

$[\text{O}^{2-}] = 3s$


$$= 2^2 s^2 3^3 s^3$$

$$= \underline{\underline{108 s^5}}$$

solubility product
 sthan 2 3 3



$$K_{sp} = (s)^1 (2s)^2 = 4s^3$$



$$[M^{y+}] = xS$$

$$[N^{x-}] = yS$$

$$K_{ip} = [M^{y+}]^x [N^{x-}]^y$$

$$\downarrow$$


$$(xS)^x (yS)^y$$

$$\textcircled{K_{sp}} =$$

$$= x^x S^x y^y S^y = \boxed{\begin{matrix} x & y & x+y \\ x & y & \textcircled{S} \end{matrix}} = K_{sp}$$


5100
2462

5100
2462



$$K_{sp} = 2^2 3^3 S^{2+3}$$

$$= 108 S^5$$



গাণিতিক সমস্যাবলি

□ $Pb_3(AsO_4)_2$ এর দ্রাব্যতা S mole/L হলে এর দ্রাব্যতা গুণফল কত?

$$x=3$$

$$y=2$$


$$K_{sp} = 2^2 3^3 S^{2+3}$$

$$= 108 S^5$$

গাণিতিক সমস্যাবলি

□ 25°C তাপমাত্রায় CaF_2 এর দ্রাব্যতা গুণফল হল $3.4 \times 10^{-11} \text{mol}^3 \text{L}^{-3}$ । ঐ তাপমাত্রায় CaF_2 এর দ্রাব্যতা কত?

$$K_{sp} = 3.4 \times 10^{-11}$$



$$K_{sp} = (S)(2S)^2 = 4S^3$$

$$\therefore S = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = 2.041 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

গাণিতিক সমস্যাবলি

Poll Question-03

□ AgCl এর দ্রাব্যতা S mole/L হলে এর দ্রাব্যতা গুণফল কত?

(a) $4S^2$

(b) $27S^2$

(c) $108S^2$

(d) S^2

$$x = 1$$

$$y = 1$$

$$\therefore K_{sp} = 1 \times 1 \times S^2 = S^2$$

দ্রাব্যতা গুণফল ও আয়নিক গুণফল - সম্পর্ক

- i. $K_{sp} > K_{ip}$ → লঘু দ্রবণ, অধঃক্ষেপ পড়বে না।
- ii. $K_{sp} = K_{ip}$ → সম্পৃক্ত দ্রবণ, অধঃক্ষেপ পড়বে না।
- iii. $K_{sp} < K_{ip}$ → অতিপৃক্ত দ্রবণ, অধঃক্ষেপ পড়বে।

১ = ১০৭
২ = দ্রবতা
৩ = ক্রমিক

১০৭ → দ্রাব্য গুণফল
১০৭ = আয়নিক গুণফল
দ্রাব্যতা ও ১০৭ related
↓
সম্পৃক্ত দ্রবণ

Poll question -4


□ $K_{sp} = 4.4 \times 10^{-3}$ and $K_{ip} = 6.8 \times 10^{-10}$ হলে অধক্ষেপ পরবে কিনা?

(a) পড়বে

~~(b) পড়বে না~~

$K_{sp} > K_{ip}$
∴ No ppt. form

গাণিতিক সমস্যাগুলি




গাণিতিক সমস্যাবলি

□ 25°C তাপমাত্রায় AgCl এর 100mL সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে 0.03M NaBr এর 100mL দ্রবণ যোগ করা হলে।

কোনো যৌগের অধঃক্ষেপ তৈরি হবে কি? [$K_{sp}(\text{AgCl}) = 1 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(\text{AgBr}) = 5 \times 10^{-13}$] (BUET)

১) K_{sp} গুণিতক
হওয়া উচিত।



$$K_{sp} = 1 \cdot 1 \cdot S^{1+1} = S^2$$


$$S = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{1 \times 10^{-10}} = 1 \times 10^{-5} \text{ M} = \text{সম্পৃক্ত} = \text{AgCl}$$

গাণিতিক সমস্যাবলি

$$K_{sp}(AgBr) = 5 \times 10^{-13}$$



প্রশ্ন এ ২য় K_{sp}
 ২য়টি ও ৩য় K_{sp} কে
 ব্যবহার করবে।



$$[Br^-]_{old} = S_2 = 0.03 M$$

$V_2 = 150 ml$
 $V_3 = 250 ml$

$$S_3 = [Br^-]_{new} = \frac{V_2 S_2}{V_3} = 0.015 M$$


$$S_3 = \frac{V_1 S_1}{V_3} = 5 \times 10^{-6} M = [Ag^+]_{new}$$

$$S_1 = [Ag^+]_{old} = 1 \times 10^{-5}$$

$V_1 = 150 ml$
 $V_3 = 250 ml$
 $S_3 = [Ag^+]_{new} = ?$

$$[Ag^+]_{new} = 5 \times 10^{-6} M$$

$$[Br^-]_{new} = 0.015 M$$



$$\begin{aligned} \checkmark K_{IP} &= [Ag^+]_{new} [Br^-]_{new} \\ &= (5 \times 10^{-6}) (0.015) \\ &= 7.5 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

const

$$K_{SP}(AgBr) = 5 \times 10^{-13}$$

$$K_{IP}(AgBr) = 7.5 \times 10^{-8}$$

$$K_{IP} > K_{SP}$$

$\therefore$ ion color

$\therefore$ 28. color $AgBr$

আয়নিক যৌগের পানিতে দ্রাব্যতা

□ ল্যাটিস শক্তি



হোম স্ট্রন

কঠিন

দ্রাব্যতা কঠিন
হোম কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন
দ্রবত্ব কঠিন

□ কেলাস

কঠিন
দ্রবত্ব
হোম স্ট্রন

কঠিন

লেগে থাকো সৎ ভাবে,
স্বপ্ন জয় তোমারই হবে।